



# Pașaportul bebelușului prematur

Sunt cunoscute 7 tratamente cheie care ar ameliora rezultatul în cazul bebelușilor născuți prematur. Aceste tratamente sunt denumite Pachetul de asistență de optimizare antenatală (Antenatal Optimisation Care Bundle) și sunt menționate mai jos. Fiecare bebeluș este unic și fiecare își face intrarea în această lume diferit. E posibil ca unele tratamente care figurează pe această listă să nu poată fi administrate. Pentru a analiza această situație, discutați cu moașa sau medicii care se ocupă de cazul dvs.. Veți lua parte la toate deciziile care au legătură cu asistența dvs.

## Locul nașterii

(bebelușii născuți prematur sau cu o greutate mică trebuie uneori să se nască într-o unitate de nivel superior, discutați cu medicul dvs. pentru a afla dacă este valabil și în cazul dvs.)



Sunt internată în spitalul optim în cazul în care bebelușul(ii) meu(i) trebuie să se nască prematur.

Știu că e posibil să fie necesar transferul meu către un alt spital, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci se poate impune transferul bebelușului(iilor) meu(i) la un alt spital după naștere.

Nu este posibil În curs Complet



## Steroidii antenatali

(pentru toți bebelușii născuți înainte de 34 săptămâni de sarcină)



Mi-a fost administrată o cură complete de steroizi care să pregătească nașterea prematură a bebelușului(iilor) meu(i).

Nu este posibil În curs Complet



## Sulfatul de magneziu

(pentru toți bebelușii născuți înainte de 30 săptămâni de sarcină)



Mi-a fost administrat Sulfat de magneziu pentru protecția creierului bebelușului(iilor) meu(i).

Nu este posibil În curs Complet



## Alăptarea la sân din primele ore de viață

(pentru toți bebelușii născuți înainte de 37 săptămâni de sarcină)



Mi s-au furnizat informații despre beneficiile alăptatului la sân al bebelușului din primele ore de viață ale acestuia și mi s-a arătat cum să mă storc pentru a produce laptele pentru bebelușul(ii) meu(i) înainte de naștere sau în interval de o oră de la naștere.

Nu este posibil În curs Complet



## Administrarea de antibiotice

(pentru toți bebelușii născuți înainte de 37 săptămâni de sarcină când mama era în travaliu)



Mi s-au administrat antibiotice pentru a reduce riscul de îmbolnăvire al(i) bebelușului(iilor) cu infecția cu Streptococ de Grup B.

Nu este posibil În curs Complet



## Gestionarea optimă a cordonului ombilical

(pentru toți bebelușii)



După nașterea bebelușului(iilor) meu(i), membrii echipei vor trebui să aștepte cel puțin o oră înainte de prinderea cordonului ombilical, pentru a permite nașterea în siguranță a bebelușului și obținerea unei cantități suplimentare de sânge din placenta.

Nu este posibil Complet



## Asigurarea unei temperaturi crescute pentru bebelușul dvs.

(pentru toți bebelușii)



După nașterea bebelușului(iilor) meu(i), membrii echipei vor încerca menținerea unei valori normale a temperaturii și ne vor ajuta să ținem bebelușul pe piele imediat ce va fi posibil acest lucru din punctul de vedere al siguranței.

Nu este posibil Complet

